

## Sindrome di Lasthénie de Ferjol

La sindrome di Lasthénie de Ferjol è una rara causa di anemia sideropenica causata dall'inflizione volontaria, da parte del paziente stesso, di autosalassi.

## Sindrome di Cotard

La sindrome di Cotard è una sindrome psichiatrica caratterizzata dalla convinzione illusoria di essere morti, di avere perso tutti gli organi vitali e tutto il proprio sangue. Jules Cotard (1840–1889), neurologo francese, fu il primo che la descrisse chiamandola "le délire de négation" (delirio di negazione) in una lezione a Parigi nel 1880. Nella sua lezione Cotard descrisse una paziente, Mademoiselle X (nome fittizio), che negava l'esistenza dei propri organi e della necessità di nutrirsi. Successivamente sviluppò la convinzione di essere dannata per l'eternità e che non poteva più morire di una morte naturale. Si suppone che derivi da una interruzione patologica delle fibre nervose che connettono il centro delle emozioni alle aree sensoriali. In tal modo, nulla riesce più ad avere una qualche rilevanza emotiva per il paziente, al punto che l'unico modo per spiegare razionalmente questa totale assenza di emozioni rimane quello di credere di essere morto. Nella sindrome di Cotard vi è un delirio di negazione cronico. La persona crede di non avere certe cose; gli individui che ne sono affetti credono che persone care siano morte o negano di avere parti del corpo, come il fegato, il cuore, eccetera, oppure credono che il loro corpo si sia trasformato, pietrificato (per esempio una madre che si dispera della morte del figlio nonostante la sua presenza nella stanza del colloquio). La sindrome di Cotard è una delle malattie più rare oggi conosciute ed è detta anche "sindrome dell'uomo morto", oppure nel mondo anglosassone "sindrome del cadavere che cammina".

## Sindrome di Charles Bonnet

Per sindrome di Charles Bonnet in campo medico, si intende un disordine complesso caratterizzato da allucinazioni complesse che si possono verificare soprattutto in soggetti anziani con problemi a livello visivo e senza disturbi mentali. La malattia è più comune in soggetti anziani, e dopo determinate operazioni chirurgiche. La causa di tale stato allucinatorio è riferita a una profonda diminuzione della vista dovuta alla degenerazione della macula o a un'anomalia della corteccia occipitale. La persona sotto tali allucinazioni riferisce di osservare persone minuscole, ferme o in movimento, simili a dei fantasmi.

